

お見積りは無料です。まずはご相談ください。

費用目安（危険作業費・廃棄物処理費含む）	
延床面積 500㎡ →	210,000円
延床面積 1,000㎡ →	260,000円
延床面積 2,000㎡ →	400,000円
延床面積 3,000㎡ →	550,000円

※上記は目安です。案件毎に諸経費を付加し、お見積り致します。お見積りには対象現場（消毒箇所）の延床面積と建物概要が必要です。

※追加料金がかかる場合がございます。

- (例) ●対象現場がJR千葉駅から半径100km圏外の場合
●日時指定がある場合
●作業開始時刻が10:00以前又は15:00以降の場合
●作業が土・日・祝日の場合
●車両内や高所など特殊箇所の施工

等

ご相談・ご依頼は営業部までご連絡ください。



株式会社千葉衛生科学検査センター

〒262-0048 千葉県千葉市花見川区柏井1-4-18
電話：043-307-8620 FAX：043-307-8630
ホームページ：http://hse-chiba.com/

ISO/IEC 17025：2017（PJLA認定番号104436）
厚生労働大臣 登録検査機関
登録衛生検査所（千保第24号）

新型コロナウイルスの施設消毒はお任せください！

施設の消毒は、本当に必要なの？

新型コロナウイルス感染症には、一般的には飛沫感染、接触感染で感染します。

「飛沫感染」とは

くしゃみ、咳、つば等と一緒にウイルスが放出され、そのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染することを言います。

※WHOは、5分間の会話、又は1回の咳で、約3,000個の飛沫が飛ぶと報告しています。

「接触感染」とは

ウイルスが付着した箇所を触ることでウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ることにより粘膜から感染することを言います。

※WHOは、新型コロナウイルスは、プラスチックの表面では最大72時間、ボール紙では最大24時間生存するなどとしています。

新型コロナウイルスに関するQ&A（一般の方向け）（厚生労働省）より

机、パソコン、壁などの環境から接触感染する危険性は、十分に考えられます。

次の状況の場合、施設消毒の実施をご検討ください。

- 新型コロナウイルス感染が疑われる方が発生した場合
- 濃厚接触が疑われる方が発生した場合
- 新型コロナウイルス感染者が発生した場合



(独)製品評価技術基盤機構(NITE)が実施した有効性評価※の結果等を踏まえ、新型コロナウイルスに対して有効な消毒・除菌方法を実施しております。

※詳細については厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」をご覧ください。



株式会社千葉衛生科学検査センター

〒262-0048 千葉県千葉市花見川区柏井1-4-18
電話：043-307-8620 FAX：043-307-8630
ホームページ：https://hse-chiba.com/

ISO/IEC 17025：2017（PJLA認定番号104436）
厚生労働大臣 登録検査機関
登録衛生検査所（千保第24号）

1 消毒方法

【使用機材】

				
シャットノクスス	サイプレスクリア	ピューラックス	布巾	ハndsプレーヤー

【作業時の服装】



対象者の感染防止及び感染拡大の観点から、防護服、ゴーグル、ゴム手袋、長靴を着用する。

※肌が露出しないように注意する

作業終了後、着用していたものは消毒し、全て破棄する。

※ウイルスをまき散らさないように脱ぐ（ガウンテクニック）

使用消毒剤	成 分 名		
サイプレスクリア	エタノール（71%） ヒノキチオール（0.01%）		
用 途	エタノール度数	希釈倍率	使用方法
空間消毒	71%	原液	超微粒子アルコールスプレー装置（シャットノクスス）を使用し空間内をアルコール消毒 使用量：約60ml/分 6～10ml/㎡（10㎡/分）
ピューラックス	次亜塩素酸ナトリウム(6%)		
用 途	有効塩素量	希釈倍率	使用方法
環境消毒	1,000ppm	60倍	布等にて手が触れる箇所の清拭

※厚生労働省HP 新型コロナウイルスに関するQ＆Aより
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/dengue_fever_qa_00001.html

2 空間内のアルコール消毒



エタノール71%を液化炭酸ガスの圧力を利用し引火の危険性がない安全かつ効果的にスプレー消毒を行います。

※電子機器があっても安心して使用可能

3 手の触れる箇所など清拭処理



次亜塩素酸ナトリウム或いはアルコールにて手の触れる箇所を清拭する。

【モノに付着したウイルス対策】

～新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について（厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ）～

- アルコール（濃度70%以上95%以下のエタノール）
＜使用方法＞濃度70%以上95%以下のエタノールを用いて拭き取ります。
- 塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム）
テーブル、ドアノブなどには、市販の塩素系漂白剤の主成分である「次亜塩素酸ナトリウム」が有効です。「次亜塩素酸」の酸化作用などにより、新型コロナウイルスを破壊し、無毒化するものです。